



# NovoSeven®: Rápido control del sangrado y eficacia constante<sup>1</sup>

- En pacientes con Trombastenia de Glanzmann con refractariedad previa o presente a transfusiones de plaquetas o donde las plaquetas no están fácilmente disponibles\*<sup>1,2</sup>

**Kali, 20 años**, está estudiando promoción de la salud y le gusta hacer yoga y relajarse al aire libre. Kali tiene Trombastenia de Glanzmann.


\*NovoSeven® está indicado para el tratamiento y prevención de episodios hemorrágicos durante cirugías o procedimientos invasivos en pacientes con Trombastenia de Glanzmann con anticuerpos a GPIIb-IIIa y/o HLA, y/o con refractariedad pasada o presente a la transfusión de plaquetas (TG refractaria).

# La Trombastenia de Glanzmann (TG) puede ser **difícil de diagnosticar**<sup>3,4</sup>


La TG afecta aproximadamente 1 en cada 1.000.000 de personas<sup>5</sup>

- Es un trastorno de la coagulación, de herencia autosómica recesiva<sup>4</sup>
- Es el trastorno hereditario de funcionamiento plaquetario de integrinas más común<sup>5</sup>
- Los pacientes suelen tener hemorragias severas y de larga duración en las mucosas, y presentar signos de hemorragias durante la niñez<sup>5</sup>

## Orientación diagnóstica de trastornos de la función plaquetaria:<sup>6</sup>



# Algoritmo para el diagnóstico de trombocitopatías y trombocitopenias hereditarias<sup>7, 8</sup>



VWD: Von Willebrand (Por sus siglas en inglés: Von Willebrand Disease); VWD 2B: Von Willebrand Tipo 2B (Por sus siglas en inglés: Von Willebrand Disease Type 2B); PT-VWD: Von Willebrand plaquetario (Por sus siglas en inglés: Platelet-Von Willebrand Disease); SPD: Síndrome de pool de depósito; SPG: Síndrome de plaquetas grises; PT/J: Síndrome de Paris Trousseau/Jacobsen (Por sus siglas en inglés: Paris Trousseau/Jacobsen Syndrome); BSS: Síndrome de Bernard Soulier (Por sus siglas en inglés: Bernard Soulier Syndrome); GPVI: Glicoproteína VI; TXA2R: Tromboxano A2; P<sup>2</sup>Y<sup>12</sup>: receptor de ADP - P<sup>2</sup>Y<sup>12</sup>; 22QDS: Síndrome deleción 22Q (Por sus siglas en inglés: 22Q Deletion Syndrome); TAR: Trombocitopenia con ausencia de radio; THC2: Trombocitopenia 2; ATRUS: Trombocitopenia amegacariocítica con sinostosis radio cubital (Por sus siglas en inglés: Amegakaryocytic Thrombocytopaenia with radio ulnar synostosis); WAS: Síndrome Wiskott Aldrich (Por sus siglas en inglés: Wiskott Aldrich Syndrome); XLT: Trombocitopenia ligada al X (Por sus siglas en inglés: X-linked thrombocytopaenia) CAMT: Trombocitopenia Amegacariocítica Congenita. (Por sus siglas en inglés Congenital Amegakaryocytic Thrombocytopaenia). FDP/AML: Desorden plaquetario familiar con predisposición a Leucemia mieloide aguda, (Por sus siglas en inglés Familial Platelet disorder with predisposition to Acute Myeloid leukemia).

# Dosis para un efectivo control del sangrado<sup>9</sup>



Rango: 80-120 µg/kg



Durante al menos 3 dosis

**Referencias:** 1. Di Minno, G et al. Haematologica 2015.100(8):1031-7. 2. Bysted, BV et al. Haemophilia 2007.13(5):527-32. 3. Bolton-Maggs, PH et al. Br J Haematol 2006.135(5):603-33. 4. Nurden, AT et al. Expert Rev Hematol 2012.5(5):487-503. 5. Nurden, AT. Orphanet Journal of Rare Diseases 2006.1:10-10. 6. [https://www.coagulationassays.com/es\\_es/home/diagnosis-monitoring/algorithm-of-glanzmanns-thrombasthenia.html](https://www.coagulationassays.com/es_es/home/diagnosis-monitoring/algorithm-of-glanzmanns-thrombasthenia.html). 7. Adaptado de: Meschengieser, S.; Bermejo, E.; Glembotsky, A.; Aris Cancela, M.; Guía de sangrado diagnóstico y tratamiento 2016. Grupo cooperativo argentino de hemostasia y trombosis. Cap. 8 (143-164) 8. Adaptado de: Lambert MP. ASH Education Book 2011; 2011:377-383 ©2011 American Society of Hematology' with permission from American Society of Hematology. 9. Prospecto NovoSeven® Disposición 7317-2018 ANMAT.



VER INFORMACIÓN  
DE PRODUCTO.  
Certificado N° 48.580.

#### Código QR

Si usted tiene dificultad con la lectura del Código QR, contactarse con:  
[atencioncli@novonordisk.com](mailto:atencioncli@novonordisk.com)  
0800-345-NOVO (6686)

AR21NS00007 | Material entregado a profesionales de la salud.



Novo Nordisk Pharma Argentina S.A.  
Av. del Libertador 350 - Piso 3 | (B1638BEP)  
Vicente Lopez - Prov. de Buenos Aires  
Domingo de Acassuso 3780/90 - 1° Piso "A" (Noreste)  
Olivos - Prov. de Buenos Aires  
+54 11 5198 6686

